



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ  
ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА  
Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и  
благополучия человека по Республике Хакасия  
(Управление Роспотребнадзора по Республике Хакасия)**

655017, Республика Хакасия, г. Абакан, ул. Маршала Жукова, д.5А-1  
Тел. 8(3902) 22-26-81, e-mail: priem@19.rosпотребнадzor.ru <http://19.rosпотребнадzor.ru>  
ОКПО 76760587, ОГРН 1051901007421, ИНН/КПП 1901066489/190101001

19.05.2026

19-00-02/23-6349-2026

Первому заместителю Главы  
Республики Хакасия- Председателя  
Правительства Республики Хакасия –  
Руководителю Аппарата Главы Республики  
Хакасия - Председателя Правительства  
Республики Хакасия и Правительства  
Республики Хакасия  
Курбатовой Т.А.

Главам администраций  
городских округов и  
муниципальных районов  
Республики Хакасия

О профилактике природно-очаговых инфекций

Уважаемая Татьяна Анатольевна!

Управление Роспотребнадзора по Республике Хакасия в рамках Комплексного плана по профилактике инфекций, передающихся клещами на 2024 - 2026 гг., информирует:

По состоянию на 18.05.2026 зарегистрировано 1098 случаев контакта населения с клещами, из них 260 детей (не превышает среднесезонных значений), 36,7% из них обусловлены пребыванием на территории города Саяногорска и его окрестностей, г. Аба-зы (13,1%), Таштыпского района (11,1%), Усть-Абаканского района (10,5%), Бейского района (6,8%), Аскизского района (4,9%), за пределами республики (завозные - 16,8%). По данным мониторинга мест присасывания клещей 89,3% случаев связано с нахождением в природных биотопах (охота, рыбалка, сбор дикоросов), на дачных участках (огородах) – 8,4%, при уходе за животными (крупно-рогатый и мелко-рогатый скот) – 2,4%, не предусмотренных планом акарицидных обработок.

При исследовании клещей, снятых с людей (552 экз.), обнаружены возбудители ик-содового клещевого боррелиоза в 21% экземпляров (СМУ - 27,5%), эрлихиоза – в 3%, клещевого вирусного энцефалита в 1,4% (СМУ - 1,8%), анаплазмоза – в 0,6%.

С начала эпидсезона зарегистрировано 5 случаев иксодового клещевого боррелиоза (г. Саяногорск), 4 случая сибирского клещевого тифа (г.Черногорск, Ширинский, Усть-Абаканский районы), 4 случая подозрения на клещевой вирусный энцефалит (г. Саяно-горск, Таштыпский район).

Профилактическими прививками против клещевого вирусного энцефалита охвачено 35006 чел. (52,4% от плана на весну), в т.ч. 10064 ребенка (35,3% от плана). За счет лич-ных средств, средств работодателей привито против КВЭ 256 чел. В медицинских органи-зациях в наличии имеется 19,7 тыс. доз противоклещевой вакцины.



Управлением на основании ст. 50, 51 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» в адрес 3 территориальных медицинских организаций, подведомственных Министерству здравоохранения Республики Хакасия, выданы Предписания в целях оперативного исполнения сетевых графиков иммунизации против КВЭ (гг. Саяногорск, Сорск, Ширинский район).

С начала эпидсезона противоклещевые обработки проведены на площади 886,3 га (59,1% от расчета - потребности), в том числе в Алтайском районе обработано 106 га (100% от потребности), г. Абакане – 92,2%, Ширинском районе – 91,4%, г. Сорске – 86%. Случаев присасываний клещей на обработанных территориях не зарегистрировано. При этом в МО г. Саяногорск обработками охвачено 35,1% подлежащей территории, Орджоникидзевском районе (12%).

Дератизационные обработки проведены на площади 254,2 га (36,3% от расчета – потребности), в том числе в г. Абакане 96,3 га (100%), Алтайском районе - 65 га (100%). В Аскизском и Бейском районах к проведению истребительных мероприятий, направленных на уничтожение грызунов, переносчиков опасных инфекционных болезней, не приступали.

Учитывая ежегодную регистрацию, в том числе в период активного туристического сезона завозных случаев заболеваний, передающихся комарами (малярия, лихорадка денге и др.) Управлением обеспечено информирование граждан, выезжающих за рубеж в страны с теплым влажным климатом по вопросам индивидуальной защиты от нападения кровососущих комаров-переносчиков (применении инсектицидных и репеллентных средств, ношении защитной одежды). Приняты дополнительные меры по оценке рисков завоза и возможного распространения среди населения опасных инфекционных болезней, передающихся преимущественно через укусы комаров. Обеспечено межведомственное взаимодействие с медицинскими организациями для своевременного выявления лиц с признаками инфекционного заболевания после возвращения из-за рубежа.

Руководствуясь ст.51 Федерального закона от 30.03.1999 года № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», поручением Роспотребнадзора от 14.05.2026 № 02/8965-2026-27 «О мероприятиях по подготовке к туристическому сезону 2026 года» предлагаем главам администраций муниципальных образований и городских округов организовать:

- проведение дератизационных мероприятий в местах высокой эпидемиологической значимости: парках, скверах, местах массового отдыха и пребывания населения, лесопарковых зонах;


- проработать вопросы ликвидации ветхих строений, несанкционированных свалок в населенных пунктах;

- проведение разъяснительной работы среди граждан о мерах профилактики клещевых инфекций, профилактики инфекций, передающихся комарами, грызунами.

Ситуация находится на контроле Управления Роспотребнадзора по Республике Хакасия.

Приложение: на 2 л.

Руководитель



Т.Г. Романова

Шалгинова Елена Юрьевна, 8(3902) 34-36-44



# Геморрагическая лихорадка с почечным синдромом (ГЛПС)



ГЛПС – зоонозная вирусная инфекция, вызываемая вирусами рода **Hantavirus**.


**Источник инфекции** – мышевидные грызуны.

## Пути передачи:

- **воздушно-пылевой**  
при вдыхании пыли, загрязненной выделениями грызунов
- **контактный**  
через поврежденную кожу и слизистые оболочки при контакте с грызунами или инфицированными объектами окружающей среды (сено, солома)
- **алиментарный**  
при употреблении воды и продуктов, загрязненных выделениями животных и не прошедших термическую обработку

## Симптомы:

- температура тела до 38–40° С
- головная боль, тошнота
- боль в горле
- увеличение лимфатических узлов
- снижение остроты зрения
- гиперемия лица
- носовые кровотечения
- боли в пояснице и животе
- мелкопятнистая сыпь



## Меры профилактики ГЛПС на даче:

- после длительного отсутствия в дачном доме проведите влажную уборку,
- перед и после уборки хорошо проветрите помещение,
- посуду тщательно вымойте и обдайте кипятком,
- мягкий инвентарь просушите на солнце в течение нескольких часов,
- во время уборки используйте средства индивидуальной защиты: влажную ватно-марлевую повязку, резиновые перчатки, сменную одежду,
- соблюдайте осторожность во время работы в хозяйственных постройках, при контакте с сеном и соломой,
- исключите возможность проникновения грызунов в жилые помещения и хозяйственные постройки,
- храните продукты питания в плотно закрытых емкостях, недоступных грызунам,
- тщательно мойте фрукты, ягоды, овощи и зелень перед едой, пейте кипяченую или бутилированную воду

cgon.rospotrebnadzor.ru



